

★ ヒブワクチンの接種スケジュール

接種開始年齢	接種回数・間隔			
生後2か月から7か月に至るまで	1回目 4週間以上の間隔※ (標準的には8週まで)	2回目 4週間以上の間隔※ (標準的には8週まで)	3回目 7か月以上の間隔※ (標準的には13か月まで)	追加接種 4回目
生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまで	初回接種(枠内)は1歳に至るまでに行うこととし、超えた場合は接種できません。もし超えた場合の追加接種は初回接種の最後の注射終了後4週間以上の間隔※で行います	1回目 4週間以上の間隔※ (標準的には8週まで)	2回目 7か月以上の間隔※ (標準的には13か月まで)	追加接種 3回目
1歳に至った日の翌日から5歳に至るまで				1回目

※ 医師が必要と認めた場合は3週間以上の間隔で接種できます。

★ 小児肺炎球菌ワクチンの接種スケジュール

接種開始年齢	接種回数・間隔			
生後2か月から7か月に至るまで	1回目 4週間以上の間隔	2回目 4週間以上の間隔	3回目 60日以上の間隔	1歳以降に追加接種 4回目
生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまで	初回接種(枠内)は標準的には1歳に至るまでに行います。もし、2歳を超えた場合は接種できません。(追加接種は可能)	1回目 4週間以上の間隔	2回目 60日以上の間隔	1歳以降に追加接種 3回目
1歳に至った日の翌日から2歳に至るまで	また、初回2回目の接種が1歳を超えた場合は、の初回3回目は接種できません。(追加接種は可能)	1回目 60日以上の間隔	2回目	
2歳に至った日の翌日から5歳に至るまで		初回接種(枠内)は標準的には生後13か月に至るまでに行います。もし、2歳を超えた場合は接種できません。(追加接種は可能)	1回目	1回目